


AB AB AB AB JHYGF

国药准字H37020717



维生素C注射液 Vitamin C Injection

5ml : 0.5g · 5支

山东新华制药股份有限公司
SHANDONG XINHUA PHARMACEUTICAL CO., LTD.

生产日期：
产品批号：
有效期至：

维生素C注射液

码上放心·追溯码
请用手机取准扫码查询
电话查询：010-9501111

301000402E

核准日期：2007.03.28
修改日期：2010.12.01
核准日期：2010.12.01
修改日期：2010.12.01

维生素C注射液说明书

请仔细阅读说明书并在医师指导下使用

【药品名称】
通用名称：维生素C注射液
英文名称：Vitamin C Injection

【性状】
本品为白色至淡黄色的澄明液体。

【规格】
5ml : 0.5g

【用法用量】
肌肉注射或静脉注射，成人每次100-200mg（1/2~1支），每日1~3次，小儿每次100-300mg（1/3~1支），分次注射。必要时，成人每次1~4g（4~8支），每日1~2次，或遵医嘱。

【不良反应】
1. 长期服用每日2g可引起肾结石。
2. 长期应用大量维生素C可引起尿酸盐、草酸盐或草酸钙结石。
3. 快速静脉注射可引起头痛、寒颤、潮红、面部充血。

【禁忌】
对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

【注意事项】
1. 维生素C对下列情况的作用未被证实：预防或治疗癌症、牙周炎、化疗、出血、视网膜病变、抑郁症、偏头痛、风湿、痔疮、不育症、雷诺病、动脉硬化、骨质疏松、缺血性神经病、脂肪肝、肝硬化、肾炎、冠状动脉粥样硬化、药物中毒、高血压、感冒等。

【孕妇及哺乳期妇女用药】
1. 维生素C对胎儿发育的影响：母体服用维生素C可增加胎儿的体重，缩短分娩时间，减少新生儿出血。
2. 维生素C对母乳的影响：母乳中维生素C的含量与母亲的摄入量有关，母亲的摄入量不足会影响母乳中维生素C的含量。

【儿童用药】
1. 维生素C对儿童的作用：维生素C对儿童的生长发育有促进作用，可提高儿童的免疫力。
2. 维生素C对儿童的副作用：长期服用维生素C可引起肾结石。

【老年用药】
1. 维生素C对老年人的作用：维生素C对老年人的心血管系统有保护作用，可降低老年人患冠心病的风险。
2. 维生素C对老年人的副作用：长期服用维生素C可引起肾结石。

【药物相互作用】
1. 维生素C与抗凝血药的相互作用：维生素C可抑制抗凝血药的作用，降低其疗效。
2. 维生素C与利尿药的相互作用：维生素C可增加利尿药的利尿作用。

【制剂】
注射液

适应症：(1) 预防或治疗坏血病；(2) 预防或治疗骨质疏松；(3) 预防或治疗动脉粥样硬化；(4) 预防或治疗糖尿病；(5) 预防或治疗青光眼；(6) 预防或治疗白内障；(7) 预防或治疗脂肪肝；(8) 预防或治疗肝硬化；(9) 预防或治疗肾炎；(10) 预防或治疗冠心病；(11) 预防或治疗高血压；(12) 预防或治疗动脉硬化；(13) 预防或治疗动脉硬化闭塞症；(14) 预防或治疗动脉硬化性闭塞症；(15) 预防或治疗动脉硬化性狭窄；(16) 预防或治疗动脉硬化性闭塞；(17) 预防或治疗动脉硬化性狭窄；(18) 预防或治疗动脉硬化性闭塞；(19) 预防或治疗动脉硬化性狭窄；(20) 预防或治疗动脉硬化性闭塞。

【禁忌】
对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。

【注意事项】
1. 维生素C对胎儿发育的影响：母体服用维生素C可增加胎儿的体重，缩短分娩时间，减少新生儿出血。
2. 维生素C对母乳的影响：母乳中维生素C的含量与母亲的摄入量有关，母亲的摄入量不足会影响母乳中维生素C的含量。

【儿童用药】
1. 维生素C对儿童的作用：维生素C对儿童的生长发育有促进作用，可提高儿童的免疫力。
2. 维生素C对儿童的副作用：长期服用维生素C可引起肾结石。

【老年用药】
1. 维生素C对老年人的作用：维生素C对老年人的心血管系统有保护作用，可降低老年人患冠心病的风险。
2. 维生素C对老年人的副作用：长期服用维生素C可引起肾结石。

【药物相互作用】
1. 维生素C与抗凝血药的相互作用：维生素C可抑制抗凝血药的作用，降低其疗效。
2. 维生素C与利尿药的相互作用：维生素C可增加利尿药的利尿作用。

【制剂】
注射液

维生素C注射液

本品为白色至淡黄色的澄明液体。
【性状】
本品为白色至淡黄色的澄明液体。
【规格】
5ml : 0.5g
【用法用量】
肌肉注射或静脉注射，成人每次100-200mg（1/2~1支），每日1~3次，小儿每次100-300mg（1/3~1支），分次注射。必要时，成人每次1~4g（4~8支），每日1~2次，或遵医嘱。
【不良反应】
1. 长期服用每日2g可引起肾结石。
2. 长期应用大量维生素C可引起尿酸盐、草酸盐或草酸钙结石。
3. 快速静脉注射可引起头痛、寒颤、潮红、面部充血。
【禁忌】
对本品过敏者禁用，过敏体质者慎用。
【注意事项】
1. 维生素C对下列情况的作用未被证实：预防或治疗癌症、牙周炎、化疗、出血、视网膜病变、抑郁症、偏头痛、风湿、痔疮、不育症、雷诺病、动脉硬化、骨质疏松、缺血性神经病、脂肪肝、肝硬化、肾炎、冠状动脉粥样硬化、药物中毒、高血压、感冒等。
2. 维生素C对胎儿发育的影响：母体服用维生素C可增加胎儿的体重，缩短分娩时间，减少新生儿出血。
3. 维生素C对母乳的影响：母乳中维生素C的含量与母亲的摄入量有关，母亲的摄入量不足会影响母乳中维生素C的含量。
4. 维生素C对儿童的作用：维生素C对儿童的生长发育有促进作用，可提高儿童的免疫力。
5. 维生素C对儿童的副作用：长期服用维生素C可引起肾结石。
6. 维生素C对老年人的作用：维生素C对老年人的心血管系统有保护作用，可降低老年人患冠心病的风险。
7. 维生素C对老年人的副作用：长期服用维生素C可引起肾结石。
8. 维生素C与抗凝血药的相互作用：维生素C可抑制抗凝血药的作用，降低其疗效。
9. 维生素C与利尿药的相互作用：维生素C可增加利尿药的利尿作用。
【制剂】
注射液

客户名称	山东新华制药			颜色	同上批生产
产品名称	E版-维生素C注射液5ml 0.5g 5支小盒				
成品尺寸	106x94x19mm			制作	新利澳
请对此稿内容进行确认：颜色、文字、版式、条码、尺寸、材质					
材质	产品	改版-E		日期	2020.10.6
客户签字	李建华		制版编号	XHZY-003	
济南金恒宇包装股份有限公司					